



Vacunas recomendadas en adultos¹



Vacunas o anticuerpos preventivos	18-26 años	27-49 años	50-59 años	≥ 60 años
Fiebre amarilla		Una dosis		Contraindicada
Hepatitis A		1 dosis (2 dosis según el riesgo)		
Hepatitis B		3 dosis (4 dosis según riesgo)		
Influenza inactivada o recombinante		1 dosis anual		
Meningococo A, C, W, Y		1 o 2 dosis según factores de riesgo		
Meningococo B		2 dosis, dependiendo de la indicación		
Neumococo (PCV13, PCV15, PCV20)		1 dosis ^a		Aplican las mismas consideraciones de dosificación que para individuos entre 19 y 59 años, pero para >65 años de edad se recomienda que todas las personas estén vacunadas
Neumococo (PPSV23)	Se sugiere para Colombia 1 dosis de PCV13 seguida de PPSV23, con refuerzo de PPSV23 cinco años después			
Sarampión, paperas, rubéola SRP	1 dosis en la edad adulta según vacunación previa y riesgo			No recomendada después de los 65 años
SARS-CoV-2	Esquema primario + refuerzo con vacunas actualizadas ARNm			
Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap o Td)	1 dosis de Tdap, luego Td o refuerzo de Tdap cada 10 años. Según riesgo y vacunas previas: 1 dosis de Tdap cada embarazo, 1 dosis de Td/Tdap para el tratamiento de heridas, 1 dosis de Tdap para la "estrategia capullo" ^b			
Varicela	2 dosis (si nació en 1980 o después)		Vacunar para zóster. Se considera inmunizado para varicela si nació antes de 1980	
Virus del papiloma humano	2 dosis hombres y mujeres Si está inmunocomprometido 3 dosis	Mujeres entre 27 a 45 años según decisión concertada con el paciente según riesgo	No aprobada	
Dengue ^c		2 dosis		No aprobada
Zóster recombinante	2 dosis para pacientes con inmunosupresión		2 dosis en todos los mayores de 50 años	

Vacuna recomendada para adultos en este rango de edad	Vacunación contraindicada en el rango de edad
Vacuna recomendada para adultos con un factor de riesgo adicional u otra indicación	Sin recomendación / No aplicable

^a. Las vacunas conjugadas deben separarse de las no conjugadas (PPSV23), mínimo 8 semanas en pacientes con fistula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear e inmunosuprimidos. En el resto de los individuos deben separarse 1 año.
^b. Según el riesgo, se puede recomendar una dosis Td/tdap para el tratamiento de heridas o 1 dosis de Tdap para "estrategia capullo".
^c. La vacuna es recomendada entre los 4 y 60 años, en un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses.

Referencias
 1. Calendario vacunas adultos - Sociedad Colombiana de Pediatría [Internet]. Sociedad Colombiana de Pediatría | SCP. 2024 [citado el 19 de julio de 2024]. <https://scp.com.co/calendario-vacunas-adultos/> (consultado el 19 de julio de 2024)

Para más información sobre las enfermedades prevenibles visita **nuestro sitio web**

www.mevacunopor.com

