



# Vacunas recomendadas

de recién nacido a los 5 años <sup>1</sup>



Vacuna	Nacimiento	2 meses	4 meses	6 meses	7 meses	9 meses	12 meses	18 meses	5 años
BCG	Dosis única								
Hepatitis B	Dosis 1								
Rotavirus (RV1)		Dosis 1	Dosis 2						
Hexavalente (DTaP, Hib, HB, IPV) <sup>a</sup> (DTaP Difteria, Tétanos y Pertussis acelular)		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3				Primer refuerzo <sup>b</sup>	
Neumococo PCV13 <sup>c</sup>		Dosis 1	Dosis 2				Refuerzo		
Influenza (Tetraivalente o trivalente)				Dosis 1	Dosis 2		Vacunación anual a lo largo de la vida <sup>d</sup>		
Varicela							Dosis 1 <sup>e</sup>		Refuerzo
Hepatitis A							Dosis 1 <sup>f</sup>		
SRP (Sarampión, rubeola y paperas)							Dosis 1 <sup>e1</sup>	Dosis 2	
Fiebre amarilla <sup>g</sup>								Dosis única	
DPT									Refuerzo <sup>h</sup>
SARS-CoV-2					La dosificación varía según la vacuna disponible <sup>i</sup>				
Meningococo Conjugada Tetraivalente(MenACWY)		La dosificación varía según la vacuna disponible						La dosificación varía según la vacuna disponible	
Meningococo B		Dosis e intervalos varían de acuerdo a la edad y el inicio del esquema						Dosis e intervalos varían de acuerdo a la edad y el inicio del esquema	

Incluida en el PAI

Vacuna complementaria no incluida en el PAI

Referencias

1. Calendario vacunas niños - Sociedad Colombiana de Pediatría [Internet]. Sociedad Colombiana de Pediatría | SCP. 2023 [citado el 19 de julio de 2024]. <https://scp.com.co/calendario-vacunas-ninos/> (consultado el 19 de julio de 2024).

a. Reemplaza la pentavalente y la IPV del PAI

b. El refuerzo de hexavalente a los 18 meses podría ser reemplazado por una pentavalente acelular. (DPaT)

c. Opcional: esquema 3+1 (2,4,6 meses y refuerzo a los 12), especialmente en pacientes con factores de riesgo.

d. Dos dosis separadas por lo menos cuatro semanas entre ellas en la primovacunación. Una dosis anual a partir de ese entonces.

e. Se puede aplicar vacuna combinada SRP+varicela.

e1. Se puede aplicar vacuna combinada SRP+varicela a los 12 y 18 meses. En este caso, se omite la dosis de varicela a los 5 años.

f. Se puede considerar refuerzo a los 6 meses de la primera dosis.

g. Se puede indicar a los 9 meses, y en zonas endémicas o de acuerdo a factores de riesgo, se puede aplicar a los 6 meses, previa prescripción médica. No indicada por debajo de los 6 meses.

h. Opción alternativa: DTaP

i. La dosificación varía según la vacuna disponible, edad recomendada de inicio de vacunación es desde los 6 meses con vacunas de ARNm. Se recomiendan refuerzos con vacunas actualizadas según epidemiología.

Para más información sobre las enfermedades prevenibles visita **nuestro sitio web**

[www.mevacunopor.com](http://www.mevacunopor.com)