



# Vacunas recomendadas en el embarazo<sup>1</sup>



## Vacunas indicadas en el embarazo

Influenza inactivada trivalente



Una dosis en cada embarazo<sup>a</sup>

Tdap (tétanos, difteria, pertussis acelular)



Dosis única a partir de la semana 26 de gestación, indicada en cada embarazo<sup>b</sup>

Vacuna contra SARS-CoV-2

En cualquier momento de la gestación<sup>c</sup>

- a. En el PAI de Colombia está indicada a partir de la semana 14 de gestación. La vacuna inactivada contra influenza puede ser administrada en cualquier trimestre, tan pronto la vacuna esté disponible. Se recomienda la vacuna tetravalente.
- b. La vacunación entre las 13-26 semanas de edad gestacional, puede considerarse en situaciones especiales (ej. amenaza de parto prematuro) para permitir la exposición placentaria a altas concentraciones de anticuerpos durante el mayor tiempo posible. Idealmente la madre debe ser vacunada por lo menos dos semanas antes del parto. Recomendar la vacunación a partir del segundo trimestre va a ampliar la ventana de oportunidades de inmunización y puede mejorar la seroprotección en el recién nacido.
- c. El colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG, por sus siglas en inglés) recomienda que se prefieran vacunas de la plataforma ARN mensajero.

Durante el embarazo se contraindican las vacunas vivas atenuadas: SRP y varicela.

### Referencias

1. Calendario vacunas embarazadas - Sociedad Colombiana de Pediatría [Internet]. Sociedad Colombiana de Pediatría | SCP. 2024. 2024 [citado el 19 de julio de 2024]. <https://scpwpoiffloadmedia.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/07/02165408/C.-Vacunal-3-02-07-24.pdf> (consultado el 19 de julio de 2024)

Para más información sobre las enfermedades prevenibles visita **nuestro sitio web**



[www.mevacunopor.com](http://www.mevacunopor.com)

## Vacunas que pueden estar indicadas en ciertas poblaciones con factores de riesgo

Vacuna contra neumococo

Hay dos vacunas disponibles contra neumoco: la vacuna polisacarida PPSV23. Se recomienda en gestantes con factores de riesgo vacuna contra neumococo PPSV23 (vacuna polisacárida), en caso de compromiso severo de inmunidad puede recomendarse PCV13 inicialmente y dos meses después PPSV23. Ambas vacunas han mostrado ser seguras.

Vacunas conjugadas contra meningococo (Men ACYW)

Se ha demostrado que las vacunas cuadrivalentes polisacáridas (Men ACWY-PS) son seguras y pueden aplicarse en las gestantes con factores de riesgo, según recomendación de profesionales tratantes.

Hepatitis A

Mujeres embarazadas en condiciones que incrementen el riesgo de adquirir la enfermedad o presentar desenlaces severos por infección por hepatitis A (enfermedad hepática crónica, trastornos de coagulación, uso de drogas inyectadas o viajes a áreas con alta endemicidad), deben vacunarse durante el embarazo.

Hepatitis B

Debe recomendarse la vacuna para mujeres identificadas con alto riesgo de infección por el virus de la hepatitis B, durante el embarazo (contactos intradomiciliarios o compañeros sexuales positivos para el Ag de superficie, mujeres que han tenido más de un compañero sexual en los últimos seis meses, aquellas que han presentado enfermedades de transmisión sexual, uso de drogas IV, pacientes con VIH o enfermedad hepática crónica). Toda mujer que desee ser vacunada, puede recibir la vacuna.